

Flokkar A meltingarfæra og efnaskiptalyf; B blóðlyf; C hjarta og æðasjúkdómalyf.

<i>Classes of medications</i>	<i>No use %</i>	<i>Constant use %</i>	<i>Temporary use %</i>	<i>Use as needed %</i>	<i>Gender differences P value</i>	<i>Relative risk (95% CI)</i>
A. Alimentary tract and metabolism						
Drugs for acid related diseases	56,3	30,5	13,2	0,1	0,005	
Men	61,9	27,3	10,6	0,2		0,81 (0,71-0,93)
Women	53,1	32,2	14,6	0		1
Drug used in diabetes	91,8	7,0	1,1		0,000	
Men	86,0	12,4	1,6			3,16 (2,19-4,55)
Women	95,0	4,1	1,1			1
Vitamin D	32,4	59,6	8,0		0,000	
Men	40,9	54,5	4,6			0,68 (0,58-0,79)
Women	27,7	62,5	9,9			1
Calcium	67,6	20,0	12,4		0,000	
Men	84,8	8,6	6,6			0,37 (0,29-0,46)
Women	58,2	26,3	15,5			1
B. Blood and blood related organs						
Warfarin	93,0	5,2	1,8		0,000	
Men	89,4	8,8	1,8			2,10 (1,44-3,07)
Women	94,9	3,2	1,9			1
Platelet inhibitors	69,5	3,3	27,2		0,39	
Men	67,7	4,0	28,3			0,57 (0,48-0,67)
Women	70,4	3,3	27,2			1
C. Cardiovascular system						
Digoxin						
Amiodarone	84,2	13,4	1,6		0,25	
Men	84,0	14,4	2,9			1,16 (0,92-1,46)
Konur	84,4	12,8	2,4			1
Nitrates	73,2	17,5	5,5	3,8	0,16	
Men	71,3	18,8	4,8	5,0		1,11 (0,93-1,33)
Women	74,3	16,7	5,9	3,1		
Diuretics	39,9	46,9	12,9	0,2	0,000	
Karlar	47,7	43,7	9,2	0		0,83 (0,37-0,91)
Konur	36,0	48,7	14,9	0,3		1
Antihypertensives	64,6	26,8	8,6		0,5	
Karlar	62,5	28,5	9,0			1,09 (0,95-1,26)
Konur	65,7	26,0	8,4			1
Beta blockers	62,9	30,1	6,9	20,1	0,56	
Karlar	65,1	28,5	6,2	0,2		0,91 (0,78-1,03)
Konur	61,6	31,0	7,3	0,1		1
Lipid modifying agents	94,7	4,3	1,0		0,008	
Karlar	92,2	6,2	1,6			2,15 (1,37-3,37)
Konur	96,0	3,3	0,7			1

Flokkar A meltingarfæra og efnaskiptalyf; B blóðlyf; C hjarta og æðasjúkdómalyf.

Table III a. Class A: Alimentary tract and metabolism; B: blood and blood forming organs; C: cardiovascular system. Proportional use %.