

Flokkar: N tauga- og geðlyf; R öndunarfæralyf og S auglyf.

<i>Lyfjaflokkur</i>	<i>Engin notkun %</i>	<i>Notkun að staðaldri %</i>	<i>Tímabundin notkun %</i>	<i>Eftir þörfum %</i>	<i>Kynjamunur P gildi</i>	<i>Hlutfallsleg áhætta (95% öryggismörk)</i>
N. Nervous system						
Ópioids	66,9	18,5	9,9	4,7	0,000	
Karlur	72,3	15,6	6,2	5,8		0,77 (0,65-0,90)
Konur	63,9	20,0	12,0	4,1		1
Paracetamol	31,6	40,2	19,1	9,1	0,000	
Karlur	38,7	35,7	16,1	9,6		0,85 (0,78-0,92)
Konur	27,7	42,7	20,8	8,8		1
Antiepileptics	88,5	7,5	3,9		0,57	
Karlur	88,6	8,2	3,2			0,98 (0,74-1,35)
Konur	88,4	7,2	4,3			1
Anti-parkinsons drugs	90,4)	6,7	2,8	NA	0,04	
Karlur	88,2	9,0	2,8			1,41 (1,02-1,92)
Konur	91,6	5,5	2,9			1
Antipsychotics	63,9	19,7	14,3	2,1	0,01	
Karlur	69,3	15,6	12,8	2,2		0,78 (0,67-0,92)
Konur	60,9	21,9	15,1	2,1		1
Sedatives/ hypnotics						
Karlur	16,3	64,9	14,5	4,3	0,05	
Konur	19,8	62,3	13,2	4,6		0,94 (0,89-0,99)
Konur	14,4	66,3	15,2	4,1		1
Antidepressants	33,0	50,7	16,3		0,004	
Karlur	38,5	47,5	14,0			0,88 (0,81-0,95)
Konur	30,0	52,5	17,5			1
All psycholeptics	8,5	82,2	9,3		0,002	
Karlur	12,2	78,4	9,4			0,94 (0,90-0,97)
Konur	6,4	84,3	9,2			1
Antidementia drugs	89,7	3,8	6,5		0,33	
Karlur	90,6	2,8	6,6			0,87 (0,63-1,21)
Konur	89,2	4,4	6,4			1
R. Respiratory system						
Drugs for obstructive airway disease	83,9	11,2	3,6		0,62	
Karlur	84,8	9,8	4,0	1,4		0,91 (0,71-1,18)
Konur	83,4	11,9	3,3	1,4		1
S. Sensory organs						
Anti-glaucoma drugs	85,0	13,3	1,7		0,38	
Karlur	86,4	12,6	1,0			0,95 (0,80-1,13)
Konur	64,0	13,6	2,1			1

Table III c. Class N: nervous system. Proportional use %.